

BİTĐİ	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bİçİmİ
Sabzeler: Domates, Elber, Patlıcan, Hiyer, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s	Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Naranciyeler: Portakal, Limon, Mandarın, Greyfurt v.s	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s	Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesi kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çiçek, Ahududu, Yaban Mersini	Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Çeviz, Badem	Çiçek öncesi, büyük atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Üzüm)	Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır, Mercimek v.s	Karışıklanma dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Sodan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.
Damla Sulama ve Salma Sulama	Yöntemi ile Dekara 1-1,5 Litre Uygulama Yapılır.

EC FERTİLİZER MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ

Magtec

Garanti Edilen İçerik **W/W**
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) **%6**



Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisini dışındadır.

Depolama ve Taşıma Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanım İliği Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında, hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görüldüğü anda kusturulmalı ve doktor çağırılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karışabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Üretici Firma: Target Tarmasal Girdiler Gemi İşletmeciliği Elektrik Su Doğalgaz Temizlik Hizmetleri ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti

Önür Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye
☎ +90 232 279 20 49 ✉ target@targettarim.com.tr
🌐 www.targettarim.com.tr



Lisans No: 1064 - Tescil No: 38243

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRT:
SKT:
PNO:
NET AĞIRLIĞI:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN
TARGET TARIM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ
DOĞAL TEM. HİZ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖNÜR Mh. ZAMBAK SK.
NO:39/A BALÇOVA / İZMİR
V.NO: 8230166695

target
Tarımsal Girdiler

EC FERTİLİZER
MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ

Magtec

Garanti Edilen İçerik W/W
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %6



target | Magtec
Tarımsal Girdiler

Bitki	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı	
Sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s	150-200 ml/da	Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s	200-300 ml/100 L su	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayıla 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin v.s	200-300 ml/100 L su	Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	200-250 ml/da	Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	200-300 ml/100 L su	Çiçek öncesi, büyük atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	200-300 ml/100 L su	Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (üzüm)	200-300 ml/100 L su	Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut Mercimek v.s	200-250 ml/da	Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	200-250 ml/da	Kol atımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	200-250 ml/da	Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	200-250 ml/da	Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 ml/da	Çiçekden 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	150-250 ml/100 L su	Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlama Sulama ve Salma Sulama Yöntemi ile Dekara 1-1,5 Litre Uygulama Yapılır.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

Depolama ve Taşıma Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanımla İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kurturulmalı ve doktor çağırılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karışabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelerle karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Üretici Firma: Target Tarımsal Girdiler Gemi İşletmeciliği Elektrik Su Doğalgaz Temizlik Hizmetleri ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

+90 232 279 20 49

target@targettarim.com.tr

www.targettarim.com.tr



Lisans No: 1064 • Tescil No: 38243

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRT:
SKT:
PNO:
NET AĞIRLIĞI:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

İbrahim Toğra ULUŞAN

TARGET TARIM SAN. TİC. A.Ş. GENEL İŞL. BÜS. SU
DOĞAL TEM. HİZM. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK.
NO:39/A BALÇOVA / İZMİR
V.NO: 823016695