

target

Tarimsal Girdiler

EC FERTİLİZER

Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)

SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

ZincBor

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor (B) %0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn) %6,5



BİTKİ

Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bİçimi

Sulazer: Domates, Biber, Patlıcan, Hyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s

150-200 ml/da

Meyve dönemi

başlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.

Marenciler: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt v.s

200-300 ml/100 L su

Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.

Meyve Ağaçları: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Aya, Nar, Zeytin v.s

200-300 ml/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır.

Çilek, Ahududu, Yaban Mersini

200-250 ml/da

Çiçek öncesi ve Meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Fındık, Ceviz, Badem

200-300 ml/100 L su

Çiçek öncesi, büyük atma ve iç bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Muz

200-300 ml/100 L su

Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.

Bağ (Üzüm)

200-300 ml/100 L su

Meyve bağlama, büyüme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır.

Hibritler: Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Mercimek v.s

200-250 ml/da

Kardelenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Kavun, Karpuz

200-250 ml/da

Kol latımından sonra 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Pamuk

200-250 ml/da

Tarık öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola

200-250 ml/da

Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Soljan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul

200-250 ml/da

Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Kesme Çiçekçilik

150-250 ml/100 L su

Yapraklanma dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damlama Sulama ve Saman Sulama Vöntemi ile Dakika 1-1,5 Litre Uygulama Yapılır.

target

Tarimsal Girdiler

ZincBor

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır.

Depolama ve Taşıma Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.

Kullanımla ilgili Uyarılar: Gözler, deri ve abiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağzı yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülmüşse hasta kurturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karışabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, kökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli harçta pestisit ve gübrelere karışabilir. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Üretici Firma: Target Tarımsal Girdiler Gemi İşletmeciliği Elektrik Su Doğalgaz Temizlik Hizmetleri ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Öğür Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

☎ +90 232 279 20 49 ✉ target@targettarim.com.tr

🌐 www.targettarim.com.tr



Lisans No: 1064 - Tescil No: 2021TK699

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIK:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.