

TAYOSOL Foliar

10-52-10 + M.E.

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilmiş İçeriği(%w/w)

Toplam Azot (N) : 10

Amonyak azotu(NH₃):10Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅): 52Suda Çözünür Potasyum Oksit(K₂O):10

Suda Çözünür Bor (B): 0.01

Suda Çözünür Bakır (Cu): 0.01

Suda Çözünür Demir (Fe): 0.03

Suda Çözünür Manganez (Mn): 0.02

Suda Çözünür Çinko (Zn): 0.06



BİTKİ	YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ	
Sebzeler; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Ispanak, Enginar v.s	150-200 gr/da	Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme öncesi döneminde bir uygulama daha yapılır.
Narenciye; Portakal, Limon, Mandarın, Greyfurt	200-250 gr/da /100 lt su	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra 1 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağaçları; Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayva, Nar, Zeytin	200-300 ml/100 lt su	Yapraklar 1-2 cm büyüklüğe ulaştığında ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır.
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	150-200 gr/da	Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme döneminde 2-3 uygulama daha yapılır.
Findik, Ceviz	200-250 gr/100 lt su	Çiçek öncesi dönemde 1-2 uygulama yapılır.
Muz	200-250 gr/100 lt su	Meyve oluşumu öncesinde 1-2 uygulama yapılır.
Bağ (Üzüm)	200-250 gr/100 lt su	Sürgünler 10-20 cm uzunluğa eriştiği zaman ilk uygulama yapılır. 2-3 hafta sonra 1 uygulama daha yapılır.
Hububat; Buğday, arpa, çeltik, Mercimek, Nohut v.s	200-250 gr/da	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte 1 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	150-200 ml/da	Dikimden 3-4 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Çiçeklenme döneminde bir uygulama daha yapılır.
Pamuk	150-200 gr/da	Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama daha sonra tarak öncesi 1 uygulama daha yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	150-200 gr/da	Bitki boyu 20-25 cm olunca ilk uygulama 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır.
Soğan, Sarımsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	200-250 gr/da	Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri İle Uygulama Biçimi

Meyve ve sebzelerde bitkinin vejetatif gelişmesinin başlangıç döneminden itibaren, 1-2 Kg TAYOSOL Foliar 10-52-10+ME yeterli miktarda su ile karıştırılarak, bir dekar arazideki bitkilere damla-sulama sistemleri ile uygulanır.

DEPOLAMA VE TAŞIMA ŞARTLARI		KULLANIMLA İLGİLİ UYARILAR		
• Serin ve kuru yerde, kilit altında orijinal ambalajında, ağız kapalı olarak gıdalardan uzak yerlerde taşıyınız ve depolayınız.	• TAYOSOL Foliar 10-52-10+ME ambalajlarını güneş ışığından uzak gölgede taşıyınız ve muhafaza ediniz.	• Depolama sıcaklığı 5-25°C dir.	• Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz.	• Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız.
			• Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz.	• Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kusturulmalı ve doktor çağırılmalıdır.
			• Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir.	• Çocuk ardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
			• Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.	
İmal Tarihi ve şarj no	Son kullanma tarihi	Net ağırlığı	Lisans No	Tescil No
	İmal tarihinden itibaren 3 yıldır		053	



Piyasaya sunacağım etikette vazanların aynı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tesbiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederim.
Mehmet Ateş
Genel Md

TAYOSis Tarımsal Araştırma ve Yeniliklerin Organizasyonu Sistemleri A.Ş.

Örnek San., 362.Sk., No: 13-15, Ostim, Ankara Tel: 0312 354 32 93 Faks: 0312 385 11 93