

# MAGNUS

EC FERTILIZER

20-5-0 +3MgO +6SO<sub>3</sub>

NP Gübre Çözeltilisi

## Garanti edilmiş içeriği %(w/w)

Toplam azot (N) : 20

Üre azotu(NH<sub>2</sub>): 20

Suda çözünür fosfor pentaoksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>): 5  
Suda çözünür Magnezyum Oksit, (MgO): 3.0  
Suda çözünür Kükürt Trioksit, (SO<sub>3</sub>): 6.0



BİTKİ	100 lt su ile karıştırılarak uygulanacak miktar	YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU VE UYGULAMA BİÇİMİ
Domates, Biber, Patlıcan (Şaşırtmadan Önce) Şaşırtmadan hemen sonra Şaşırtmadan sonra	200-250 cc	İlk uygulama fideler yastıkta iken bir teneye suya 50 gr <b>MAGNUS</b> karıştırılıp, bitkiler bununla sulanır. İlk uygulama çimlenme yeni başladığında yapılır. Can suyu olarak topraktan 250 gr. Bir dekar fideyi sulayacak biçimde uygulanır. 10-15 gün aralıklarla 4 uygulama yapılır.
Hıyar, Kabak	200-250 cc	Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3-5 uygulama daha yapılır.
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt)	200-250 cc	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz	200-250 cc	Bitki yaprakları 1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3-4 uygulama daha yapılır.
Çilek	200-250 cc	Bitkiler uyanmaya başladığında ilk uygulama yapılır. 10 gün arayla 3-5 uygulama daha yapılır.
Fındık, Ceviz, Ayva, Nar	200-250 cc	Bitki yaprakları 1-2 cm büyüklüğüne gelince ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2 uygulama daha yapılır.
Muz	200-250 cc	Erken ilkbahardan itibaren 15 gün arayla 3-5 uygulama yapılır.
Bağ (Üzüm)	200-250 cc	Sürgünler 10-20 cm uzunluğa eriştiği zaman ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Zeytin	200-250 cc	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır.
Buğday, arpa, çeltik	150-200 cc	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte 1000 lt lik bir depoya 5 lt <b>MAGNUS</b> karıştırılarak uygulanır.
Kavun, Karpuz	200-250 cc	Bitki boyu 15-20 cm olunca ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt)	200-250 cc	Çiçeklenme öncesi ilk uygulama yapılır. 30 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Pancar	200-250 cc	Seyreltme sonrası ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3 uygulama daha yapılır.
Pamuk, Patates	200-250 cc	Bitki boyu 15-20 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 2 uygulama daha yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün	200-250 cc	Bitki boyu 15-25 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 2 uygulama daha yapılır.
Soğan, Sarımsak, Pırasa, Havuç, Lahana, Marul	200-250 cc	Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-4 uygulama daha yapılır.
Kanola, Yonca, Mercimek, Nohut	200-250 cc	Bitki boyu 5-15 cm olunca ilk uygulama yapılır. 20 gün arayla 1-2 uygulama daha yapılır.
Soya, Fasulye, Bakla, Yer Fıstığı, Bezelye	200-250 cc	Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 3-5 uygulama daha yapılır.
Enginar, Kereviz, Karnabahar,	200-250 cc	Bitki boyu 5-15 cm olunca ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır.
Turp, Ispanak, Bamyası	200-250 cc	Bitki boyu 5-10 cm arasındayken ilk uygulama yapılır. 15 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır.
Süs Bitkileri	200-250 cc	Vejetasyon süresince 20 gün arayla sürekli uygulama yapılır.

### Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri İle Uygulama Biçimi

Meyve ve sebzelerde bitkinin vejetatif gelişmesinin başlangıç döneminden itibaren, 2-4 lt **MAGNUS** yeterli miktarda su ile karıştırılarak, bir dekar arazideki bitkilere damla-sulama sistemleri ile uygulanır.

DEPOLAMA VE TAŞIMA ŞARTLARI	KULLANIMLA İLGİLİ UYARILAR
<ul style="list-style-type: none"><li>Serin ve kuru yerde, kilit altında orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzak yerlerde taşıyınız ve depolayınız.</li><li><b>MAGNUS</b> ambalajlarını güneş ışığından uzak, gölgede taşıyınız ve muhafaza ediniz.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz.</li><li>Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız.</li><li>Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz.</li><li>Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görülürse hasta kusturulmalı ve doktor çağırılmalıdır.</li><li>Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir.</li><li>Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.</li></ul>

İmal Tarihi ve şarj no	Son kullanma tarihi	Net ağırlığı	Depolama sıcaklığı	Lisans No	Tescil No
	İmal tarihinden itibaren 3 yıldır		5-25°C	053	



TS EN ISO 9001 : 2000 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

## TAYOsis

Tarımsal Araştırma ve Yeniliklerin Organizasyonu Sistemleri A.Ş.  
Örnek San., 362.Sk., No: 13-15 Ostim, Ankara  
Tel: 0312 354 32 93 Faks: 0312 385 11 93

Piyasaya sunacağım etikette yazanların ayımsız olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tesbiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederim.

**TAYOsis TARIMSAL ARAŞTIRMA ve YENİLİKLERİN ORGANİZASYONU SİSTEMLERİ A.Ş.**  
Mehmet Ateş Genel Md.  
Örnek San. 362. Sk. No: 13-15 Ostim, Ankara  
Tel: 0312 354 32 93 Faks: 0312 385 11 93  
Tic. Sic. No: 271100  
Vergi No: 833 010 7744